

44 麦類・大豆奨励

(1) 小 麦

早 晩 性	品 種 名	来 歴 (育成場所) 育 成 年	採 用 年 次	供 試 年 次	は 種 期 月 日	出 穂 期 月 日	成 熟 期 月 日	稈 長 cm	穂 長 cm	穂 数 本/m <sup>2</sup>
中 生	[認定品種] ナンブコムギ	農林33号×農林27号 (盛岡農改実) 昭和26年	昭 和 5 6 年	平10 ~12	10 月 1 日	5 月 13 日	6 月 24 日	105	9.9	480
中 生	[認定品種] ゆきちから	東北141号×さび系23号 (東北農業研究センター) 平成14年	平 成 1 9 年	平13 ~16	10 月 1 日	5 月 13 日	6 月 25 日	88	8.3	521

(2) 大 豆

早 晩 性	区 分	品 種 名	来 歴 (育成場所) 育 成 年	採 用 年 次	供 試 年 次	は 種 期 月 日	開 花 期 月 日	成 熟 期 月 日	生 態 型	主 茎 長 (cm)	分 枝 数 (本)	主 茎 節 数
中 晩 生	中 粒 白 目	[奨励品種] タチユタカ	房成×刈系92号 (東北農試) 昭和62年	昭 和 6 2 年	平10 ~12	6 月 3 日	8 月 1 日	10 月 12 日	II c	58.0	4.1	16.8
中 生	大 粒 白 目	[優良品種] リュウホウ	スズユタカ×刈交343F <sub>6</sub> (東北農試) 平成7年	平 成 1 3 年	平12 ~14	6 月 5 日	7 月 26 日	10 月 4 日	II b	45.0	4.0	12.2
中 生	極 小 粒 白 目	[優良品種] すずかおり	刈交778F <sub>5</sub> ×コスズ (東北農試) 平成13年	平 成 1 5 年	平12 ~15	6 月 5 日	8 月 3 日	10 月 8 日	II c	57.0	5.9	15.5
中 生	大 粒 白 目	[認定品種] エンレイ	農林2号×東山6号 (長野中信農試) 昭和46年	平 成 1 7 年	平12 ~14	6 月 5 日	7 月 29 日	10 月 7 日	II b	66.0	5.0	14.4
中 晩 生	大 粒 白 目	[優良品種] 里のほほえみ	東北129号×刈交0264MYF <sub>6</sub> (東北農業研究センター) 平成20年	平 成 2 1 年	平19 ~20	6 月 8 日	8 月 1 日	10 月 17 日	II c	72.0	4.7	15.2

# 品種等の特性表

芒の長短	株の開閉	穂発芽性	脱粒性	播種性程度	玄麦			質の硬軟	品質	抵抗性				
					10収a当り(kg)	千粒重(g)	容積重(g/斗)			耐寒雪性	耐倒伏性	耐肥性	凍抵抗害性	さび病
短	中	難	難	V	511	41.8	827	軟	中の中	強	やや強	強	強	中
極短	中	中	難	V	444	39.9	795	硝子質	中の下	強	強	強	強	強

草型	伸育型	毛茸の色	花の色	熟莢色	裂莢性	子実					粗蛋白質%	粗脂肪%	品質	耐倒伏性	病害虫抵抗性			
						10収a当り(kg)	百粒重(g)	粒形	裂皮	種皮色					臍色	ウイルス病	紫斑病	ダイズシスト
閉鎖型 長茎主茎	有限	白	紫	暗褐	難	324	26.4	扁球	難	黄白	黄	※42.3	※21.4	上の中	強	極強	中	中
閉鎖型 短茎主茎	有限	白	紫	褐	中	304	29.4	楕円形	難	黄白	黄	※43.9	※19.9	中の上	強	AB強 CD弱	中	強
開張型 短茎分枝	有限	白	紫	淡褐	中	340	11.2	球	難	黄白	黄	40.5	20.4	中の上	強	極強	やや強	弱
開張型 長茎主茎	有限	白	紫	褐	中	359	31.4	球	難	黄白	黄	44.5	18.9	上の下	中	AB強 CD弱	中	弱
閉鎖型 長茎主茎	有限	白	白	中	難	337	37.2	扁球	難	黄白	黄	44.9	20.3	上の下	強	強	強	弱

※ H14~H16の平均値