



令和2年度 第3号

令和2年7月3日

# 西おきたま 雪若丸だより

山形おいしさ際立つ！米づくりプロジェクト置賜地域本部 西置賜農業技術普及課

出穂2日早い予想！今年のおいしい「雪若丸」づくりのポイントは

- 1 葉色を低下させないことが大事！
- 2 遅れず&生育診断に基づく“食味重視”の穂肥！

## 1 生育状況（6月30日現在）

雪若丸実証ほの生育は、指標値に比べ「草丈は並み～長く」、「茎数は多く」、「葉数はやや多く」、「葉色はやや濃い」状況です。

出穂期は「平年並～2日程度早い」予想です。穂肥は遅れず行き、生育過剰な場合は施肥量を減らす等、“食味重視”の穂肥でおいしい「雪若丸」づくりに努めましょう。

( )内は指標比・差

6月30日現在	草丈 (cm)	茎数 (本/m <sup>2</sup> )	葉数 (枚)	葉色 (SPAD)	
雪若丸	川西町	42.1 (103)	759 (129)	10.2 (+0.9)	44.4 (+1.4)
	飯豊町	50.1 (122)	697 (118)	9.9 (+0.6)	46.7 (+3.7)
	指標	41.0	590	9.3	43.0

## 2 直ちに中干し・作溝を行いましょう！

- 中干しは田面に小ヒビが入る程度を基本とします。
- 生育量が大きい場合や、葉色が濃い場合は →強め
- 生育量が小さい場合や、葉色がさめかかっている場合は →弱め
- 作溝を行うことにより、出穂期～登熟期まで効率的な水管理ができます。

## 3 「雪若丸」の生育診断について（9.5葉、6月30日頃）

### 【前提条件】

- 中干しを行い、土壤環境を整え、上根を張らせ、穂肥のできる状態までイネを仕上げる。
- 幼穂形成期まで葉色（SPAD値）を40未満に低下させない。  
「はえぬき」より、生育量が多くても、中干しの強度を上げすぎない。  
※「雪若丸」の葉色は「はえぬき」より、全般に濃く推移する。  
偏穂数型でm<sup>2</sup>茎数は「はえぬき」より、多くなる。
- 目標収量 600kg/10a、検査等級1等、玄米粗タンパク含有率 7.5%以下（乾物換算）とする。

予想出穂期 8/3～5 → 穂肥時期の目安（出穂25日前） 7/9～11頃

## 【 生育診断のポイント 】

### ○目標とする食味・収量・品質を確保するための生育指標（9.5 葉時）

莖数 750 本/m<sup>2</sup>（坪当たり 70 株植え：35 本/株）以下

葉色 4.4（SPAD 値）以下

※m<sup>2</sup>籾数を 30,000 粒程度とし、登熟を高めて、食味、品質を向上！

### ○穂肥は出穂 25 日前、窒素成分で 1.5kg/10a を基本とする。

生育診断結果により、次のように対応する

生育量	莖数	葉色 (SPAD)	追肥対応 (8月2日出穂の場合)
生育不足	560 本/m <sup>2</sup> 未満	40 未満	早めの穂肥 出穂 30 日～26 日前 (7月4日～6日頃) N成分 1.5kg/10a
適 正	560～750 本/m <sup>2</sup>	40～44	出穂 25 日前 (7月9日～11日頃) N成分 1.5kg/10a
生育過剰	750 本/m <sup>2</sup> 以上	44 以上	出穂 25 日前 (7月9日～11日頃) 葉色の低下を確認し、減肥対応 N成分 1.0～1.2kg/10a

## 4 いもち病・斑点米カメムシ類の対策は万全に！

○梅雨入り以降、いもち病の感染に好適な気象条件が発生しており、葉いもちの蔓延に注意が必要です。圃場をよく見回り、**早期発見、早期防除**を徹底しましょう。

○イネ科雑草が繁茂している**畦畔・農道等の草刈り**を地域ぐるみで徹底し、カメムシ類の生息密度低減に努めましょう。また、水田内のノビエやイヌホタルイなどの雑草は斑点米カメムシ類の水田侵入・増殖を促します。**水田内の残草処理**を徹底しましょう。（※除草剤の使用の際は使用基準を遵守）

7月1日 **斑点米カメムシ注意報発表！**

発生量多い！今すぐ草刈りを行い、斑点米カメムシ類の密度を減らしましょう！



## 農作業事故・熱中症に注意！

◎「もうちょっと…」という無理が重大事故につながります。

◎暑い日が続きます。熱中症予防のために水分補給と休息をしっかりと取りましょう！

山形県農薬危害防止運動実施中！～農薬を使用する際は使用基準を再確認！その都度記帳！～